

REANIMA

PARACETAMOL

CAFEÍNA

Comprimidos

Industria Argentina Venta Libre

FÓRMULA

Cada comprimido contiene: Paracetamol 500 mg, Cafeína 50 mg
Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Celulosa Microcristalina, Polivinilpirrolidona, Estearato de Magnesio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico - Antifebril.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

Reanima está indicado para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfrios y reducir la fiebre.

Como usar este medicamento:

Adultos y Niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas.

Dosis máxima: 8 comprimidos por día.

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al Paracetamol o Cafeína. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.

La ingesta de paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

No tomar por más de 5 días si el dolor persiste o por más de 3 días para la fiebre. Consulte a su médico.

Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este producto.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Si usted toma anticoagulantes, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio consulte con su médico antes de ingerir este producto.

REACCIONES ADVERSAS

Erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

Ocasionalmente puede producir inquietud, excitación, insomnio.

SOBREDOSIS

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Intoxicaciones:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital de Niños Dr. Pedro De Elizalde (011) 4300-2115

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

CONSERVACIÓN

A temperatura ambiente (no superior a 30°C), dentro de su envase original.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 19.571

021EM00052-02



LABORATORIO
OMICRON

LABORATORIO OMICRON S.A.

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), Pdo. de San Martín,
Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos: 4752-5081 / 4754-1043.
Director Técnico: Mauro Soria - Farmacéutico.